

Раголевич Г.С., Богданович В.И.,  
Горноста́й П.В., Скидан А.Г., Литвин А.А.,  
Хмылко А.И.

**НАЛОЖЕНИЕ НАРУЖНЫХ  
КИШЕЧНЫХ СТОМ С ЛЕЧЕБНОЙ  
ЦЕЛЬЮ.**

/ Гомель /

Мы проанализировали опыт наложения  
кишечных стом в Гомельской областной кли-  
нической больнице и выезжая в районные

больницы по линии санавиации, за период 1985 - 1997 год.

Всего оперировано 187 больных. Показаниями к наложению тонко- и толстокишечных стом были : распространенный гнойный перитонит, на почве травмы или несостоятельности швов ушитой кишки или анастомоза (68), перфорации кишки, опухоли толстой кишки на фоне непроходимости или перфорации (72), сегментарный тромбоз сосудов брыжейки (12), запущенные формы кишечной непроходимости (17), и ущемление грыжи (18).

Создавая вынужденно наружные кишечные стомы, мы преследуем цель купировать острый воспалительный процесс в брюшной полости, вызвать декомпрессию кишки и тем самым уменьшить интоксикацию и улучшить микроциркуляцию в стенке кишки, предупредить расхождение швов анастомоза, обеспечить временный или постоянный пассаж по кишечнику. На тонкой кишке чаще накладывали петлевые и концевые стомы (108), реже двухствольные стомы (7). При наложении петлевой и двухствольной стомы мы одновременно накладываем серозно-мышечные швы бок-в-бок на приводящий и отводящий отрезки кишки, создавая уже одну из стенок будущего анастомоза. Кроме того, при высоких свищах мы собираем кишечный химус и заливаем в отводящую петлю, тем самым уменьшая метаболические сдвиги в организме.

При несостоятельности гастродуодено- и гастроеюноанастомозов после резекции желудка, мы считаем целесообразным единственным способом спасения больных от истощения и смерти наложение питательной еюностомы по Майдлю.

Такую же операцию мы выполняем при травмах тощей кишки для декомпрессии межкишечного соустья.

Стомы на толстой кишке накладывали при раке левой половины ободочной кишки, осложненном обтурационной кишечной непроходимостью, и травмах.

Цекостомию, как декомпрессивную операцию мы не выполняли, так как она не позволяет полностью исключить пассаж содержимого по толстой кишке. Умерло после операции 27 больных.